

หากถูกสุนัขหรือ แมวกัด ข่วน ต้องทำอะไร



ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาด อย่างเบาๆ
หลายๆ ครั้ง (เป็นเวลา 15 นาที) การ
ล้างแผลจะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง
80%



ใส่ยา

ทายาเบตาดีนและรีบมาพบแพทย์
โดย**เร็วที่สุด** เพื่อรับการรักษาและ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค



กักหมา

กักหมาไว้ดูอาการ 10 วัน ถ้าตายให้
นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตายแสดงว่า
สุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



หาหมอ

ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัดและ
เข้ารับวัคซีนให้ตรงตามที่แพทย์
นัด

คาถา 5 ย. ป้องกันสุนัขกัด.

อย่าแหย่

ให้สุนัขโมโห



อย่าเหยียบ

สุนัขหรือทำให้ตกใจ

อย่าแหยก

สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบ

ขามอาหารหรือของที่สุนัขหวง

อย่ายุ่ง

กับสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่
ทราบประวัติวัคซีน



โรคพิษสุนัข บ้า





องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่นิยมเรียกกันว่าโรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นโรคติดต่อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต โดยพบได้ในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ซึ่งพาหะนำโรคที่สำคัญที่สุด คือ สุนัข แมว โค กระบือ สุกร เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อหากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



RABIES VIRUS

อาการของโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มต้น

มีนิสัยและอารมณ์เปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง



2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังโล่กัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต


ค้างตาก ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดเชื่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดเชื่อได้



2. ถูกเลี้ยงที่บาดแผล รอยถลอกหรือรอยขีดข่วนรวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา

อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไง

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

อาการเริ่มแรก

ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคุณรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด

อาการทางประสาท

กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว

อาการระยะสุดท้าย

กล้ามเนื้อเกร็ง-กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก เน้นหน้าอก หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด